






L'ensoleillement de l'été 2026 à Brest

Été météorologique (juin-juillet-août) — station Brest-Guipavas (29075001)

Insolation et fraction d'insolation 1997-2026 (30 étés) · rayonnement global 1997-2026 (30 étés)

Boîte = quartiles Q1-Q3 et médiane · moustaches = valeurs extrêmes situées à moins de $1,5 \times \text{IQR}$ des quartiles · cercles = valeurs atypiques au sens de Tukey · points gris = chacune des autres années



Source : Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes, fichiers « autres-paramètres » (data.gouv.fr) — généré le 04/09/2026

Insolation mesurée par héliographe, seuil de 120 W/m² de rayonnement direct. Le rayonnement global n'est mesuré que depuis le milieu des années 1980.

Série volontairement tronquée à 1997 : la durée d'insolation comporte des ruptures instrumentales (remplacement progressif des héliographes Campbell-Stokes, qui sur-lisent), pouvant atteindre une centaine d'heures par été. Les décennies antérieures ne sont donc pas comparables. Le rayonnement global, mesuré au pyranomètre, n'est pas affecté.

Il n'existe pas de série d'indice UV exploitable ici : le champ UV de Météo-France n'est renseigné qu'à Carpentras, 2010-2019.

© 2026 Frédéric Pallu — CC BY-NC 4.0